



Dados

Paciente:

Idade:

Empresa: ABC Endoscopia Ltda - ME

Whatsapp: (11) 99887-9151

Data:

RECEITUÁRIO

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS RECOMENDAÇÕES

ALERGIA: () SIM () Não

Pantoprazol 40 mg ----- QSP.

Tomar 01 comprimido pela manhã em jejum por 07 dias antes do procedimento.

No dia do procedimento iniciar 01 comprimido de 12/12h em jejum por 14 dias e, em seguida, 01 comprimido cedo em jejum até completar 16 semanas.

Sucrafilm 1g (flaconete ou mastigável) ----- QSP.

Tomar uma unidade de 12 em 12h por 05 dias (para azia ou queimação ou refluxo) ou até o fim dos sintomas.

Dramin B6® ----- QSP.

Tomar 40 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

Vonau Flash® 8 mg ----- QSP.

Tomar 01 comprimido de 08 em 08 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

Lisador® ----- QSP.

OU Buscopan composto ou Duo/plus ou Tropinal ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

Luftal® gotas/cápsula gel ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

Chegando em casa já inicie a medicação independentemente de haver ou não sintomas. Inicie também e siga à risca a dieta prescrita pela nutricionista.

Os exercícios físicos são liberados no 14º dia após o implante, lembrando que é importante que nos primeiros dias não esteja sozinho devido a possibilidade de apresentar fraqueza por conta da dieta.

Dr. Marcio Lamas Lopes
CRM-SP 133420
Cel: (11) 98409-6670

Dr. Rodrigo Porphirio Sant'ana
CRM-SP 114910
Cel: (11) 99952-4430